

		Vaccinations obligatoires pour les nourrissons											
Âge approprié	1 mois	2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
BCG													
Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite													Tous les 10 ans
Coqueluche													
Haemophilus Influenzae de type b (HIB)													
Hépatite B													
Pneumocoque													
Méningocoque C													
Rougeole-Oreillons-Rubéole													
Papillomavirus humain (HPV)													
Grippe													Tous les ans
Zona													

Vaccins Age <sup>1</sup>	Nourrissons				Enfants et adolescents				Adultes			
	8 SEMAINES 3 MOIS	12 SEMAINES 3 MOIS	16 SEMAINES 4 MOIS	12 MOIS	13 - 15 MOIS	5 - 6 ANS	7 - 9 ANS	11 - 13 ANS	15 - 16 ANS	Femme enceinte	≥ 25 ans puis tous les dix ans	≥ 65 ans
Poliomyélite <sup>2</sup>	IPV	IPV	IPV		IPV	IPV						
Diphthérie Tétanos Coqueluche <sup>3</sup>	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa			dTpa	dTpa	dTpa	dTpa
Haemophilus Influenzae type b <sup>4</sup>	Hib	Hib	Hib		Hib							
Hépatite B <sup>5</sup>	VHB	VHB	VHB		VHB							
Rougeole Rubéole Oreillons <sup>6</sup>				RRO <sub>1</sub>		RRO <sub>2</sub>	x x x					
Méningocoque C <sup>7</sup>					MenC							
Pneumocoque <sup>8</sup>	PCV13		PCV13	PCV13								PCV13 + PCV23
Rotavirus <sup>9</sup>	Rota	Rota	(Rota)									
Papillomavirus humain (HPV) <sup>10</sup>								HPV 2 doses				
Influenza <sup>11</sup>										Influenza tétra		Influenza tétra